


CASO CLÍNICO 01

Este paciente nos procurou com a queixa de dor na região mandibular. Queria remover os dentes remanescentes, fazer nova prótese superior e instalar implantes no arco inferior. Para a arcada inferior foi oferecido *overdenture* (sobredentadura) retida por Encaixe Bola e *O'rings*. Foi dado também a opção de se confeccionar a prótese tipo Protocolo (dentadura fixa aparafusada), porém ele optou pela *overdenture*.




- 1) Paciente tinha uma dentadura superior antiga e apresentava linha de sorriso reta, envelhecendo o sorriso.




- 2) Paciente relatava dificuldade para mastigar.



- 3) Dentes inferiores tinham indicação de exodontia.



- 4) Observar grande perda óssea na região anterior da mandíbula, na radiografia panorâmica inicial.



- 5) Dentes remanescentes inferiores foram extraídos.



- 6) Instalação dos implantes na região antero-inferior da mandíbula.



- 7) Instalação dos *abutments* Bola que são parafusados nos implantes, após cicatrização. Eles são apertados nos implantes por meio de um torquímetro.



8) Radiografia panorâmica final.



9) Próteses finalizadas.



10) Os O'rings são presos com resina acrílica dentro da prótese inferior.



11) As próteses foram instaladas. Observar encaixe da oclusão.



- 12) Observar a estabilidade das próteses. O paciente projeta a língua para fora e as próteses não se deslocam.



- 13) Observar harmonia de conjunto das próteses.



- 14) Início e final do tratamento.



- 15) Vista extra-oral frontal. O paciente relatou uma melhora muito grande na qualidade da mastigação, além da estética.